SIDEWALL CORE Depth in metres	G'ina angiporoides (S.S.)	G'ina euapertura	G'quad tripartita	G'oides bisphericus	G'oides triloBus	G'ina bulloides	G'ina woodi connecta	G'ina woodi woodi	G'alia miozea miozea	G'alia peripheroronda	G'alia praescitula	G'alia zealandica (S.S.)	G'alia continuosa Gp.	G'alia nana Gp.	G'quad dehiscens (S.S.)	G'quad advena	G'quad altispira	Globigerinids - indet (<.25mm)	G'ina ciperoensis	G'alia bella	Praeorb. glomerosa Gp.	G'oides trilobus (elongate)	S'ellopsis seminulina	G'alia praemenardii	Orb. suturalis	G'alia conica	Orb. universa	G'alia panda	G'alia miozea conoidea	G'alia siakensis/mayeri	G'alia peripheroacuta	G'alia lenguaensis	G'alia miotumida miotumida	G'alia scitula	G'alia acostaensis	PLANKTONIC FORAMINIFERAL ASSEMBLAGE ZONE	Depth at Base	AGE
600.0						°		°										D									°							°	°	°			
625.0				°		•		°										D									°							°		°			
663.0						x		•																			°							°					
690.0					°													D									°												LATE
720.0																		D											x										
750.0						D		x																			°							°	°		B-2		MIOCENE
782.0																		D									°												
805.0					x	x																					x							x	x	°			
830.0								°										D																					
849.0						x		x								°		D									°							x		°		849.0	
897.0								°										D									°										C		
928.0					x	x		x																			x		x	x				x					
965.0								°							°			D						°			x		°	x		°		°	°			965.0	
980.0																		D									°	°									?		
1010.0																		D									°											1010.0	
1040.0									°									D	x										°	x									
1055.0								x			°					°								°			°												
1060.0						x		x	x		x				x											°	x			x	x					°			MID
1077.0								x			°																°			x	°								
1092.0					°	x		°	°															°			x	°	x	x	°						D-1		
1110.0					°	x		x	x	°														°			x	°	x	°	°								MIOCENE
1115.0					°	x																					°		°	°									
1130.0						x		x	x		°																x		x	x	°								
1140.0					°	x		x																			x		x	x	°								
1150.0					°	x		x																			x		x	x	°							1150.0	
1160.0				x	x			x	x													°			x				x										
1170.0				x	x			x	x	°		x			x	°						°					x	x	°			°							
1180.0				x	x	x		x	x	x	x	°			x				x	°	°			x	°	°	x	°	x	x									
1187.0				x	x	x		x	x	°	x	°							°	°	x	°		x	°	x	x	°	x	°							D-2		
1195.0				x	x	x		x	x	x	x	x								x	°			x	x	°	x	°	x	x									
1199.0		R		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	°	x	x		x	°	°	x	°	x										
1203.0				x	x	x		x	x	°	x	x	x	x	x	x	x		x	°	x	x	°	x	°	°	x	°	x									1203.0	
1207.0				°	°	x		x	°																		°										?	1207.0	
1225.0				x	x	x		x	x		°	°		x	x					°	°	°	°	°	°													E-1	1225.0	
1240.0				x	x	x		x	x	°	x									x	x	x	°	°														E-2	1240.0	
1256.0				x	x	x		x	x	°	x	x		x	x	°	°		x	x																				EARLY
1265.0				°	°	x		x	x		°	°								°																				
1270.0				°	x	x		x				x	x	x					x	x																	F		MIOCENE
1278.0				x	x								x	x	x	x	°	D																					
1282.5				°	°	x	x	x	x	°	x	x																										1282.5	
1285.0	° ° °																																						
1286.5	NO PLANKTONICS FOUND																																				J		EARLY OLIGOCENE
1288.0	° ° °																																					1288.0	
1291.0	NO PLANKTONICS FOUND																																				?		?

Key: • = <20 specimens D = >60% specimens
x = >20 specimens R = recycled specimens

TABLE 1: PLANKTONIC FORAMINIFERAL DISTRIBUTION - HAMMERHEAD # 1

Paltech Report 1982/19

FORAMINIFERAL SEQUENCE BY PALTECH

DEPT. NAT. RES & ENV
PE904996